

## PROMEMORIA POST AGOBIOPSIA PERCUTANEA DELLA MAMMELLA

Alcune raccomandazioni per le signore che si sottopongono ad agobiopsia percutanea della mammella.

- la medicazione che Le è stata applicata va rimossa la sera successiva;
- il sacchetto di ghiaccio istantaneo che Le è stato fornito va applicato a contatto con la pelle e mantenuto in sede per mezz'ora circa. Non serve ripetere l'applicazione;
- la formazione di una placchetta sottocutanea a livello del sito del prelievo, dura al tatto, modicamente dolorante, associata a cambiamento del colore della cute (es. blu/violaceo) è normale ed è dovuto alla formazione di ematoma sottocutaneo, che si risolverà nel giro di qualche settimana;
- può applicare, una volta rimossa la medicazione, una pomata per facilitare il riassorbimento dell'ematoma (es. arnica gel, Reparil gel, ecc.);
- si raccomanda di non assumere farmaci contenenti acido acetilsalicilico, qualora si rendesse necessaria l'assunzione di un antifiammatorio/antidolorifico nei giorni successivi alla procedura.

Il prelievo viene inviato immediatamente per l'analisi all'Anatomia Patologica, ma per il referto è necessario attendere circa 10/15 giorni dall'esecuzione dell'esame.

**Il ritiro del referto cito/istologico della mammella avverrà presso il Centro Medico Esperia, via dei Serviti 10 – Porcia con il seguente orario:**

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ dalle 8:30 alle 18:30

SERVIZIO DI SENOLOGIA 0434 590222

mail: [senologia@centromedicoesperia.it](mailto:senologia@centromedicoesperia.it)