

## **PROMEMORIA POST AGOBIOPSIA PERCUTANEA DELLA MAMMELLA**

Alcune raccomandazioni per le signore che si sottopongono ad agobiopsia percutanea della mammella:

- la medicazione che Le è stata applicata va rimossa la sera successiva;
- il sacchetto di ghiaccio istantaneo che Le è stato fornito va applicato a contatto con la pelle e mantenuto in sede per mezz'ora circa. Non serve ripetere l'applicazione;
- la formazione di una placchetta sottocutanea a livello del sito del prelievo, dura al tatto, modicamente dolorante, associata a cambiamento del colore della cute (es. blu/violaceo) è normale ed è dovuto alla formazione di ematoma sottocutaneo, che si risolverà nel giro di qualche settimana;
- può applicare, una volta rimossa la medicazione, una pomata per facilitare il riassorbimento dell'ematoma (es. arnica gel, Reparil gel, ecc.);
- si raccomanda di non assumere farmaci contenenti acido acetilsalicilico, qualora si rendesse necessaria l'assunzione di un antifiammatorio/antidolorifico nei giorni successivi alla procedura.

Il prelievo viene inviato immediatamente per l'analisi all'Anatomia Patologica, ma per il referto è necessario attendere circa 10/15 giorni dall'esecuzione dell'esame.

Il ritiro del referto cito/istologico della mammella avverrà presso il Policlinico Città di Udine allo sportello "Ritiri referti", a destra nel corridoio centrale con il seguente orario:

**DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ dalle 8 alle 19**

**il SABATO dalle 8 alle 12**

**SERVIZIO DI SENOLOGIA 0432 239376 o 0432 239377**