

## INFORMATIVA: PAP TEST

È un esame di prevenzione che si esegue a scopo di individuare precocemente anomalie cellulari a livello del collo uterino (non dell'intero organo). **NON SOSTITUISCE LA VISITA GINECOLOGICA**, che è la prestazione atta a dare informazioni sull'intero organo genitale.

### DOVE ESEGUIRLO

Il prelievo per il PAP test si effettua presso il Reparto di Ginecologia-Ostetricia (piano terra), il lunedì e il mercoledì, dalle 8 alle 10.

Prima di sottoporsi all'esame occorre registrare la prestazione presso l'Accettazione Centrale (piano terra) e poi presentarsi alla segreteria del reparto.

### COME PREPARARSI ALL'ESAME

Affinché l'esame sia attendibile, è necessario:

- effettuare (il mattino e la sera precedenti il prelievo) una accurata igiene esterna dei genitali;
- non fare uso, nei giorni precedenti il prelievo, di creme e/o lavande vaginali;
- evitare le giornate corrispondenti con il ciclo mestruale, e i giorni immediatamente precedenti e/o successivi;
- astensione dai rapporti sessuali nei tre giorni precedenti l'esame.

## TAMPONE VAGINALE ED ENDOCERVICALE

### DOVE ESEGUIRLO

Il prelievo per il tampone vaginale ed endocervicale si effettua presso il Reparto di Ginecologia-Ostetricia (piano terra), il lunedì e il mercoledì, dalle 8 alle 10 (per motivi organizzativi, si consiglia l'accesso nelle mattine di lunedì e mercoledì).

Prima di sottoporsi all'esame occorre registrare la prestazione presso l'Accettazione Centrale (piano terra) e poi presentarsi prima al laboratorio per il ritiro del materiale e successivamente alla segreteria del reparto.

### COME PREPARARSI ALL'ESAME

Affinché l'esame sia attendibile, è necessario:

- effettuare (il mattino e la sera precedenti il prelievo) l'igiene esterna dei genitali solo con acqua, evitando in particolare detergenti e/o disinfettanti che possano alterare l'ambiente vaginale;
- non fare uso, nei giorni precedenti il prelievo, di creme vaginali, lavande, candelette, ecc.;
- evitare rapporti sessuali non protetti nei tre giorni precedenti il prelievo;
- evitare assolutamente di accedere al prelievo nelle giornate corrispondenti con il ciclo mestruale;
- eventuali cure antibiotiche e/o lavande vaginali devono essere sospese almeno 10 giorni prima del prelievo.