


NOTA INFORMATIVA

RICOSTRUZIONE LEGAMENTOSA AL GINOCCHIO, IN ARTROSCOPIA, CON IMPIANTO DI INNESTO TENDINEO DA BANCA DEI TESSUTI(ALLOGRAFT)




Il legamento crociato anteriore, LCA da acronimo, assieme al legamento crociato posteriore ed ai due legamenti collaterali, svolge il ruolo di stabilizzatore del ginocchio garantendo il corretto funzionamento dell'articolazione. In particolare la sua integrità risulta indispensabile per svolgere attività sportiva di prima fascia o attività lavorativa pesante. Oltre a questo, un LCA valido garantisce il benessere del ginocchio a lungo

termine; infatti, le persone che hanno subito lesioni plurime al legamento crociato anteriore o non hanno provveduto alla sua ricostruzione con tempestività sono più a rischio di artrosi.

L'intervento di ricostruzione del LCA avviene mediante artroscopia: si tratta di una procedura operatoria mini invasiva dotata di accuratezza diagnostica e potenzialità chirurgiche. L'intervento prevede l'utilizzo di uno strumento particolare, chiamato artroscopio, inserito nella cavità articolare attraverso una piccola incisione cutanea di circa 1 cm; una seconda incisione, anch'essa di circa 1 cm, consente l'introduzione degli strumenti previsti per "lavorare" all'interno del ginocchio.

L'artroscopia, che costituisce il primo tempo dell'intervento, rappresenta l'indagine più completa di tutte le formazioni anatomiche della cavità articolare e consente possibilità di valutazione statica e dinamica, mentre gli altri accertamenti diagnostici, compresi TAC o RMN, non forniscono risultati di assoluta certezza. È possibile che all'atto dell'artroscopia possano essere riscontrate condizioni anche difformi rispetto a quanto diagnosticato mediante gli accertamenti non invasivi precedentemente praticati (lesioni condrali, pliche sinoviali patologiche, lesioni meniscali). In questi casi le procedure chirurgico-terapeutiche programmate potrebbero subire variazioni rispetto a quanto preventivato.





A. Achilles tendon



B. Hamstring tendon




C. Patellar tendon

Il ripristino della stabilità articolare viene realizzato mediante la sostituzione del legamento leso con un neoligamento sostitutivo proveniente da Banca dei Tessuti (Allograft). Per l'ancoraggio del neolegamento saranno impiegati materiali di fissazione biocompatibili, metallici o riassorbibili.

Il vantaggio di questa tecnica rispetto a quella che prevede l'utilizzo di tendini del proprio ginocchio, consiste nel fatto che viene mantenuta l'integrità anatomica del ginocchio e vengono eliminati i disturbi legati al prelievo tendineo (dolore, tumefazione).

Nel caso la lassità articolare appaia particolarmente importante, alla sostituzione del legamento crociato



anteriore potrebbe rendersi necessario associare dei gesti chirurgici ulteriori, le cosiddette "plastiche periferiche di rinforzo".

Nonostante gli evidenti fattori positivi derivanti dall'impiego della tecnica operatoria descritta, il trattamento non è esente da rischi, pur essendo questi ridotti rispetto ad altri procedimenti operatori più invasivi.

Non è possibile escludere **complicanze intraoperatorie** quali le rotture intrarticolari degli strumenti chirurgici utilizzati e le sempre possibili, seppur altamente improbabili, lesioni vascolari o neurologiche periferiche. L'insorgenza di tali complicanze, o la diagnosi artroscopica di alcune rare patologie intrarticolari (cisti meniscali, corpi mobili o neoformazioni endoarticolari), può rendere necessario il ricorso ad artrotomia tradizionale con esecuzione di procedure chirurgiche a cielo aperto.

Tra le possibili **complicanze postoperatorie locali** vanno ricordate:

- La tumefazione del ginocchio, a seguito di sanguinamento, che può verificarsi nell'immediato post-operatorio o che potrà insorgere a distanza di alcuni giorni;
- La rigidità articolare: si intende con questo termine un certo grado di perdita della mobilità del ginocchio: generalmente si tratta di un fenomeno temporaneo che va contrastato con l'intensificazione del protocollo riabilitativo. Nei casi più gravi può richiedere successivi trattamenti chirurgici quali manovre di mobilizzazione articolare, artrolosi artroscopica, artromiolisi;
- La residua instabilità da secondario allentamento del neolegamento;
- Le complicanze post-operatorie infettive per le quali verrà effettuata una profilassi antibiotica come da protocollo interno;
- Le complicanze di tipo vascolare quali le flebotrombosi o le tromboembolie per le quali verrà effettuata una profilassi antitromboembolica come da protocollo interno;
- Le complicanze legate alla presenza dei mezzi di sintesi utilizzati per la fissazione (mobilizzazione, rottura, intolleranza);
- Le complicanze legate all'utilizzo di un innesto da banca dei tessuti (allograft) (rischio remoto di trasmissione di malattie infettive non note, difficoltà di attecchimento dell'innesto);
- La formazione di cicatrici ipertrofiche/cheloidi.

Risultati

L'obiettivo dell'intervento è il ripristino della stabilità articolare che consenta una ripresa dell'attività sportiva, anche agonistica.

Statisticamente questo si ottiene in circa l'80% dei casi.

Il risultato complessivo si presenta correlato a fattori anche indipendenti dalla corretta esecuzione tecnica dell'intervento, quali la situazione di partenza dell'articolazione, la risposta biologica dell'organismo, la qualità e la quantità della riabilitazione eseguita e il rispetto delle prescrizioni postoperatorie.

L'innesto tendineo infatti necessita di tempi biologici lunghi per l'attecchimento e la neovascolarizzazione; per questo motivo per la ripresa dello sport bisogna attendere almeno 6 mesi, pena un'alta probabilità di fallimento dell'intervento.

Io sottoscritt_____ nat____ il ____ / ____ / ____

dichiaro con la presente che:

1. mi è stato diagnosticato_____;
2. mi è stato pertanto proposto di sottopormi a RICOSTRUZIONE LEGAMENTOSA AL GINOCCHIO CON ALLOGRAFT, procedura medico-chirurgica cui acconsento di sottopormi in base a quello che mi è stato spiegato relativamente ai benefici ragionevolmente attendibili, ai rischi ed alle conseguenze - anche negative - che ne possono derivare (vd. Mod. ORT 24 – “Nota informativa per ricostruzione LCA con Allograft”);
3. ho potuto porre al dott. _____ le domande che ritenevo opportune, e ho da questi ricevuto risposte chiare e comprensibili; mi è stata consegnata documentazione integrativa (cartacea e/o di altro tipo: Mod. ORT 24 – “Nota informativa per ricostruzione LCA con Allograft” e/o _____) in tempi utili affinché io potessi prendere una decisione consapevole circa la prosecuzione dell’iter diagnostico e terapeutico propostomi. Mi è anche stato spiegato che l’intervento sarà programmato solo dopo la valutazione anestesiologica;
4. **sono stat__ informat__ che posso anche cambiare idea, in qualunque momento, revocare il consenso qui espresso**, e decidere di non sottopormi alla pratica medico-chirurgica in questione. Le conseguenze, per il mio caso, potrebbero essere: _____

_____;
5. Sono stat__ informat__ che la procedura si svolgerà in ricovero ordinario.

Udine, ____ / ____ / ____

(con la firma si dichiara di accettare la procedura indicata al punto 2)

Il Dichiante**Il Medico** (timbro e firma)

Nome e cognome del soggetto sostitutivo nei casi previsti dalla legge_____

Nome e cognome dell’eventuale interprete _____

Estremi documento identità, sia per un caso che per l’altro _____

CONFERMA DEL CONSENSO, qualora acquisito prima di 3 mesi dalla data della procedura

Data di conferma_____ Il Dichiante_____