

## RISONANZA MAGNETICA

### PREPARAZIONE PER GLI ESAMI DI RISONANZA MAGNETICA (RM) DELLA PELVI

Presentarsi agli sportelli della segreteria **almeno 40 minuti prima dell'orario dell'appuntamento** per effettuare l'accettazione.

Si raccomanda di:

- ✓ rimuovere eventuali lenti a contatto;
- ✓ presentarsi senza cosmetici di alcun tipo;
- ✓ togliere tutti gli accessori metallici (gioielli non in oro, piercing, ecc.);
- ✓ indossare biancheria intima TASSATIVAMENTE di cotone.

#### **IMPORTANTE! Il giorno dell'esame portare con sé:**

- **richiesta del Medico curante e/o Specialista;**
- **tessera sanitaria** con eventuali esenzioni
- **Radiogrammi/CD e referti di esami precedenti** (RX, Risonanza Magnetica, TAC, ecografie, esami di laboratorio, lettere di dimissione, visite specialistiche, ecc.) relativi al quesito da studiare (compresi quelli eventualmente eseguiti in altre strutture);
- **tessera sanitaria** con eventuali esenzioni;
- **per lo studio della prostata**, il referto del dosaggio del PSA, effettuato al massimo un mese prima della Risonanza Magnetica, e possibilmente i referti relativi ai più recenti dosaggi precedenti;
- **se previsto utilizzo di mezzo di contrasto**, il referto del dosaggio della creatininemia effettuato al massimo 3 mesi prima della Risonanza Magnetica;
- anamnesi e consenso informato per l'esame di Risonanza Magnetica compilato in ogni sua parte;
- **modulistica specifica per lo studio della pelvi**, compilata.

Si raccomanda di segnalare eventuali allergie sul modulo di consenso per l'indagine.

#### PER STUDIO DI PELVI FEMMINILE

- praticare **a domicilio** 2 clisteri di pulizia (acquistabili in farmacia senza ricetta): uno la sera prima dell'esame, l'altro due ore prima dell'esame; la pulizia intestinale è fondamentale, visto che al momento dell'esame potrebbe essere necessaria la distensione dell'ultima parte dell'intestino con gel;
- vuotare la vescica un'ora prima dell'esame e poi iniziare a bere (su istruzione del personale) in modo da ottenere un medio grado di distensione vescicale;
- **in struttura, prima dell'esame**, potrebbe essere necessaria l'iniezione intramuscolare o endovenosa di un farmaco che riduce la contrazione della muscolatura intestinale e uterina (Buscopan).

#### PER STUDIO PROSTATA

- -praticare **a domicilio** 2 clisteri di pulizia (acquistabili in farmacia senza ricetta): uno la sera prima dell'esame, l'altro due ore prima dell'esame; la pulizia intestinale aiuta la corretta valutazione della prostata.

#### PER STUDIO DEL RETTO

- praticare **a domicilio** 2 clisteri di pulizia (acquistabili in farmacia senza ricetta): uno la sera prima dell'esame, l'altro due ore prima; la pulizia intestinale è fondamentale, visto che al momento dell'esame è indispensabile la distensione dell'ultima parte dell'intestino con gel;
- **in struttura, prima dell'esame**, verrà praticata l'iniezione endovenosa di un farmaco che riduce la contrazione della muscolatura intestinale e uterina (Buscopan).